福山地区水産振興対策協議:平成23年度　広島県栄養塩調査結果　　第10報　　平成23年12月22日　（木）



まとめ：広島県農林水産局水産課

三態窒素合計値は横田を除いて非常に低い状態が続いています。
早めの摘採を行うなど，漁場におけるノリの総量を抑制する必要があります。

水温は順調に低下し始め，概ね昨年度と同じ～以下になりました。

次回調査は平成23年12月27日を予定しています。

栄養塩調査結果　　採水年月日　平成23年12月20日　（火）　　分析機関：㈱エヌ・イーサポート

	場所名	採水時刻	天候	水温℃	昨年同期	窒素 μg-at/l				昨年同期
					H22.12.21	アンモニア態	亜硝酸態	硝酸態	三態合計	H22.12.21
st.1	田尻	8:00	はれ	12.8	12.7	ND	ND	ND	0.0	4.9
st.2	鞆の浦	9:10	はれ	13.5	12.7	ND	0.1	ND	0.1	4
st.3	田島	9:25	はれ	14.0	15.0	ND	0.3	0.5	0.8	2.2
st.4	走島	7:45	はれ	13.4	14.0	1.3	0.2	0.5	2.0	2
st.5	横田	9:35	はれ	14.5	15.1	ND	0.6	3.7	4.3	4.4
st.6	大浦									
st.7	矢の島									